

# Nachsorgeempfehlung Rektumkarzinom

DZ\_IN\_Nachsorgeempfehlung\_Rektumkarzinom\_250408

**Endoskopie:** Bei unvollständiger präoperativer Untersuchung (z. B. Ileus, stenosierender Tumor): nach 3–6 Mon., sonst nach 1 Jahr postoperativ. Bei erneuten Polypen (Entfernung!) alle 1–2 Jahre. Bei unauffälligem Befund alle 3–5 Jahre.

Programmierte Untersuchungen im Rahmen der Nachsorge bei kolorektalen Karzinomen UICC I – IV kurativ, je nach Ausprägung chirurgischer Eingriff oder Watch and Wait:

Nachsorge nach chirurgischem Eingriff														
Monat (nach Resektion)	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60
Körperl. Untersuchung, CEA, ggf. ctDNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Koloskopie		X <sup>1</sup>												X
CT Thorax/Abdomen		X		X		X		X		X		X		X
MRT Rektum	X	X		X		X		X		X		X		X
Rektoskopie		X		X		X		X		X		X		X

<sup>1</sup> falls präoperativ nicht durchgeführt

Nachsorge bei Watch and Wait														
Monat (nach dem Staging nach TNT)	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60
Körperl. Untersuchung, CEA, ggf. ctDNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Koloskopie		X <sup>1</sup>												X
CT Thorax/Abdomen		X		X		X		X		X		X		X
MRT Rektum	X	X	X	X		X		X		X		X		X
Rektoskopie, digital rektale Untersuchung	X	X	X	X		X		X		X		X		X

<sup>1</sup> falls vor TNT nicht durchgeführt