

# Nachsorgeempfehlung- Trophoblasttumore

(Die Änderungen im Vergleich zur Vorversion sind grau unterlegt)

## Gynäkologischer Malignome

Im Vordergrund der Nachsorge steht stets die individuelle Ausrichtung mit einem informativem Gespräch, ausführlicher Anamnese und einer klinischen und symptomorientierten Untersuchung. Klinische Hinweise und Symptome erfordern zusätzlicher apparativer Diagnostik und laborchemischen Untersuchungen.

Handlungsmaxime sind:

- Verbesserung der Heilungschancen durch Früherkennung eines Frührezidivs (lokales, regionäres Rezidiv)
- Lebensverlängerung durch Erkennen einer Metastase (kurativer Ansatz)
- Erhaltung der Lebensqualität bzw. Lebensverbesserung durch Linderung der Symptome (palliativer Ansatz)
- Diagnose und Therapie postoperativer, radiogener, chemo-endokriner Nebenwirkungen
- Sexualität und Partnerbetreuung.

Der Nutzen einer strukturierten Nachsorge in Bezug auf eine Reduktion der krankheitsbedingten Mortalität ist nicht sicher erwiesen. Die Nachsorgeuntersuchungen sollten in den ersten drei Jahren vierteljährlich erfolgen, im vierten und fünften Jahr halbjährlich und danach jährlich stattfinden.

## Trophoblasttumore

<b>Nachsorge Untersuchungen nach abgeschlossener lokaler Therapie sollte</b>	<b>1. bis 3. Jahr</b>	<b>4. bis 5. Jahr</b>	<b>nach dem 6. Jahr</b>
Klinische und sonographische Untersuchung	Vierteljährliche Intervalle	Halbjährliche Intervalle	Jährliche Intervalle
Mammografie	Alle 2 Jahre (je nach Alter der Betroffenen bzw. ab dem 50. Lebensjahr)		
Apparative Diagnostik (Röntgen, CT, MRT, Knochenszintigramm, PET)	Eine intensivierete apparative Diagnostik ist bei fehlenden klinischen Symptomen nicht indiziert.		
Labortechnische Diagnostik	Eine intensivierete Labordiagnostik (Tumormarker, Serumbiochemie) ist bei fehlenden klinischen Symptomen nicht indiziert. Wenn Tumormarker bestimmt werden, dann sollte CEA, CA 125, AFP, HCG bestimmt werden.		

### Literatur:

S-1 Leitlinie AWMF Leitlinienregister Nr.: 032/049–Aktualisierung 01-04-2022