

Nachsorgeempfehlung kurativ Lymphom

Patientenname
Geburtsdatum
(Aufkleber)

Aggressive B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome (B-NHL) / Mantelzell-Lymphom / T-NHL / M. Hodgkin Indolente B-NHL nach kurativer Radiatio (St. I und II n. Ann Arbor)

Therapieansatz: kurativ

Allgemein: Die Nachsorge erfolgt symptomorientiert.

Ziel ist das Erkennen von Rezidiven, von Spätfolgen der Chemotherapie oder Bestrahlung, von Zweitmalignomen oder kardiovaskulären Erkrankungen.

Wichtig: Konsequente Einstellung kardiovaskulärer Risikofaktoren und Wahrnehmung der üblichen Krebsvorsorgeuntersuchungen. Die Durchführung von Sonographie / Röntgen Thorax während der Nachsorgetermine ist fakultativ. Weitere bildgebende Verfahren sind nur im Falle von Symptomen oder Rezidivverdacht indiziert.

Nachsorgemaßnahme	Intervall	Dauer
Anamnese, körperliche Untersuchung, Diff.-Blutbild, klinische Chemie inkl. LDH, BSG	alle 3 Monate	1. und 2. Jahr
TSH nach 1, 2 und 5 Jahren	alle 6 Monate	3.-5. Jahr
<u>Fakultativ:</u> Abdomen-Sonographie, Röntgen Thorax	jährlich	nach dem 5. Jahr

Quellen: DGHO-Leitlinie 2010-2018, NCCN guidelines 2017-2018, ESMO guidelines 2013-2017