

## Nachsorgeempfehlung- Magenfrühkarzinom

Med1\_IN\_Nachsorgeempfehlung\_Magenfruehkarzinom\_endoskopische\_  
Therapie\_kurative\_Intension\_140306

Die Nachsorge beginnt mit Erreichen der kompletten Remission:

- bei R0-Status des Resektats 1 Kontroll-ÖGD (nach 8 Wochen) mit negativer Biopsie
- bei Rx/R1-Status 2 Kontroll-ÖGDs im Abstand von 3 Monaten, bei einer Therapiedauer > 6 Monaten zwingend Restaginguntersuchungen (EUS, Abdomensonographie, CT-Abdomen) auch während der Therapiephase

**Low-risk-Situation:** pT1m, G1-2, L0 V0

Nachsorgemaßnahme	Intervall	Dauer
ÖGD	alle 3 Monate	1. Jahr
	alle 6 Monate	2. Jahr
	alle 9 Monate	3.-5. Jahr
	alle 12 Monate	nach dem 5. Jahr

**High-risk-Situation:** pT1sm1 und/oder G3

Nachsorgemaßnahme	Intervall	Dauer
ÖGD und EUS	alle 3 Monate	1. Jahr
ÖGD	alle 3 Monate	2. Jahr
EUS und Abdomensonographie	alle 6 Monate	
ÖGD, EUS, Abdomensonographie	alle 6 Monate	3. Jahr
ÖGD	alle 6 Monate	4.-5. Jahr
EUS	alle 12 Monate	
ÖGD	alle 12 Monate	nach dem 5. Jahr

GI Onko Manual: Diagnostik & Therapiestandards gastrointestinaler Tumoren 2014