

Nachsorgeempfehlung Magenkarzinom, Adenokarzinom, gastroösophagealer Übergang

(Die Änderungen im Vergleich zur Vorversion sind grau unterlegt.)

Therapieansatz: kurativ (nach Magenresektion)

Allgemein: Ziel ist das Erkennen von Funktionsstörungen als mögliche Therapiefolge oder Zeichen eines Rezidivs, die Überprüfung des Ernährungszustandes und ggf. die Einleitung unterstützender Maßnahmen.

Nach Magenresektion ist die Überprüfung des Vitamin B12-Spiegel (und ggf. Substitution) von Bedeutung.

Nachsorgemaßnahme	Intervall	Dauer
- Anamnese, körperliche Untersuchung, Gewicht - Blutbild, klinische Chemie	alle 3 Monate	1. und 2. Jahr
	alle 6 Monate	3.- 5. Jahr
	jährlich	nach dem 5. Jahr
- ÖGD und Bildgebung	Alle 6 Monate jährlich	1. und 2. Jahr 3. - 5. Jahr

Nachsorgemaßnahme	
Vit. B12, Eisen, Transferrin-Sättigung, Ferritin	nach 3 und 6 Monaten, dann jährlich

Quellen: **S3-Leitlinie Magenkarzinom 2019, DGVS**